

ANIMALIVM BELGICORVM

A

L A V R. T H E O D. G R O N O V I O

O B S E R V A T O R V M

C E N T V R I A T E R T I A.

INSECTA COLEOPTERA.

201. SCARABAEUS thorace inermi, occipite spina erecta armato. *Linn. Spec. anim. gen.* 170. n. 17.

Scarabaeus capite thoraceque atro opaco, elytris cinereis nigro-nebulosis. *Linn. Fn. Suec.* §. 354.
Habitat sub stercore.

DESC. *Caput* planum subretusum margine postico elevato, tricorni; cornu intermedio subulato, erecto, longiori, laterali utrinque minimo. *Thorax* latus, brevis, antice retusus, laevis, opacus. *Elytra* totum abdomen subtegentia, laevia, testacea, nigris longitudinalibus lineolis striata. *Pedes & Abdomen* nigricant.

202. SCARABAEUS muticus ater, glaber, elytris fulcatis, capite rhombaeo vertice prominulo. *Linn. Spec. anim. gen.* 170. n. 30.

Scarabaeus ater, dorso glabro, elytris fulcatis, capitis clypeo rhomboide, vertice prominulo. *Linn. Fn. Suec.* §. 349.

Mas duplo minor foeminâ.

203. SCARABAEUS muticus, elytris glabris laevissimis; capitis clypeo rhombaeo, vertice prominulo. *Linn. Sp. anim. gen.* 170. n. 31.

Scara-

Scarabaeus caeruleescens, dorso elytris glabris laevissimis, capitis clypeo rhomboide, centro prominulo.

Linn. Fn. Suec. §. 350.

Mas vix minor, quam foemina.

204. *SCARABAEUS muticus testaceus*, thorace villoso, cauda inflexa, incisuris abdominis albis. *Linn. Sp. anim. gen.* 170. n. 43. *Fn. Suec.* §. 345.

205. *SCARABAEUS muticus testaceus*, thorace villoso, elytris luteo-pallidis, lineis tribus albis pallidis. *Linn. Spec. anim. gen.* 170 n. 44.

Scarabaeus testaceus, thorace villoso; elytris luteo-pallidis: lineis tribus albis longitudinalibus. *Linn. Fn. Suec.* §. 346.

206. *SCARABAEUS muticus*, antennarum lamellis septenis aequalibus; corpore nigro albedine irrorato. *Linn. Spec. anim. gen.* 170. n. 46

Scarabaeus antennarum lamellis septenis aequalibus corpore nigro, elytris maculis albis sparsis. *Linn. Fn. Suec.* §. 343. Belgis *Molenaar*.

207. *SCARABAEUS muticus niger tomentoso-flavus*, elytris fasciis duabus luteis coadunatis. *Linn. Spec. anim. gen.* 170. n. 47.

Scarabaeus niger hirsutius flavus, elytris fasciis duabus luteis coadunatis. *Linn. Fn. Suec.* §. 348.

Habitat aestivo tempore in rosis.

208. *SCARABAEUS muticus*, capite thoraceque caeruleo piloso, elytris griseis, pedibus nigris. *Linn. Spec. anim. gen.* 170. n. 42. *Fn. Suec.* §. 351.

Habitat in arboribus ad vias publicas, in Hollandia rarus.

209. *SCARABAEUS muticus*, auratus; abdominis segmento secundo latere unidentato. *Linn. Spec. gen.* 170. n. 52.

Vol. V.

Q

Scara-

Scarabaeus corpore viridi aeneo. *Linn. Fn. Suec.* §. 344.
Habitat aestivo tempore in hortis, delectatur rosarum &
pœoniae floribus.

210. SCARABAEUS maxillofus, maxillis exsertis, apice bifur-
catis. *Linn. Spec. anim. gen.* 170. n. 58.

Scarabaeus cornibus duobus mobilibus, apice bifurcis, in-
trorsum ramo denticulisque instructis. *Linn. Fn. Suec.*
§. 337. (Mas).

Scarabaeus maxillis lunatis prominentibus, dentatis, tho-
race inermi. *Linn. Faun. Suec.* §. 338. (Foemina).

Habitat in Sylvis Quercinis Gelricis, in Hollandia raro re-
peritur.

Foemina hujus speciei dimidio minor masculo, cum in
plerisque Insectis mas foeminâ minor fit.

211. DERMESTES niger, elytris antice cinereis. *Linn. Spec.*
anim. gen. 171. n. 1. *Fn. Suec.* §. 360.

Habitat in Lardo & carne fumo indurata.

212. SILPHA oblonga, clypeo orbiculato inaequali, elytris
fascia duplici ferruginea. *Linn. Spec. anim. gen.* 173. n. 2.

Scarabaeus clypeo emarginato; elytris nigris, fasciis dua-
bus transversis rubris. *Linn. Fn. Suec.* §. 347.

Habitat sub terra, cadavera sepeliens.

213. SILPHA oblonga nigra, elytris punctis duobus ferrugi-
neis. *Linn. Spec. anim. gen.* 173. n. 4.

Dermestes niger, coleoptris punctis rubris quaternis. *Linn.*
Fn. Suec. 364.

Habitat in gramine.

214. SILPHA atra; elytris laevibus, lineis elevatis tribus, cly-
peo orbiculato nitido. *Linn. Spec. anim. gen.* 173. n. 11.

Callida atra elytris lineis tribus elevatis, antennis antice
testaceis. *Linn. Fn. Suec.* §. 380.

Habitat in hortis & agris sub terra.

215. SIL-

215. SILPHA atra; elytris subpunctatis, lineis elevatis tribus;
 clypeo antice integro. *Linn. Spec. anim. gen.* 173. n. 12.
 Cassida nigra; elytris lineis tribus elevatis laevibus, spatio
 interjecto punctato, clypeo antice integro. *Linn. Fn.*
Suec. §. 385.
 Vivit cum antecedente.

216. SILPHA nigricans, elytris rugosis lineis elevatis tribus;
 thorace emarginato. *Linn. Spec. anim. gen.* 173. n. 15.
 Cassida atra, elytris striis quinque punctisque elevatis. *Linn.*
Fn. Suec. §. 379.
 Vivit cum antecedente.

217. CASSIDA viridis. *Linn. Spec. anim. gen.* 174. n. 1.
 Cassida viridis ovata, laevis; clypeo caput tegente integro.
Linn. Fn. Suec. §. 377.
 Habitat in hortis.

218. CASSIDA pallide-nebulosa. *Linn. Spec. anim. gen.* 174.
 n. 2.
 Cassida nebulosa pallida, ovalis, clypeo caput tegente
 integro. *Linn. Fn. Suec.* §. 378.
 Præcedente rarior.

219. CASSIDA flava immaculata, corpore testaceo. *Linn. Spec.*
anim. gen. 174. n. 6.

220. COCCINELLA coleoptris rubris; punctis nigris duobus.
Linn. Spec. anim. gen. 175. n. 2. *Fn. Suec.* §. 388.
 Habitat in Urtica & Alno.

221. COCCINELLA coleoptris rubris punctis nigris septem.
Linn. Spec. anim. gen. 175. n. 8. *Fn. Suec.* §. 391.
 Coccinella Anglica vulgatissima, seu rubra 7 maculis no-
 tata. *Petiv. Gaz. tab.* 21. fig. 3.

222. COCCINELLA coleoptris fulvis, punctis nigris decem.
Linn. Spec. anim. gen. 175. n. 10.

Q 2

223. COC-

223. COCCINELLA coleoptris luteis, punctis nigris tredecim.
Linn. Spec. anim. gen. 175. n. 12. Fn. Suec. §. 395.
224. COCCINELLA coleoptris flavis, punctis nigris quatuordecim, quibusdam concretis. *Linn. Spec. anim. gen. 175. n. 13.*
225. COCCINELLA coleoptris luteis, punctis nigris quindecim, plerisque geminatis, thorace nigro punctato.
Desc. *Magnitudo* praecedentis: *Puncta* oblongiuscula plerumque per paria coleoptris inscripta, medio maximo. *Thorax* flavus punctis minutissimis atris obspersus. Habitat in Urtica.
226. COCCINELLA coleoptris flavis; punctis nigris viginti duobus. *Linn. Spec. anim. gen. 175. n. 16. Fn. Suec. §. 401.*
227. COCCINELLA coleoptris nigris punctis rubris sex. *Linn. Spec. anim. gen. 175. n. 30. Fn. Suec. §. 407.*
228. CHRYSOMELA ovata, violacea, alis rubris. *Linn. Spec. anim. gen. 176. n. 8.*
229. CHRYSOMELA cylindrica, thorace elytrisque testaceis, pedibus nigris. *Linn. Spec. anim. gen. 176. n. 55.*
Habitat in Lilio.
230. CURCULIO longirostris, subglobosus, coleoptris maculis duabus atris dorsalibus. *Linn. Spec. anim. gen. 177. n. 27.*
Curculio subglobosus, punctis duobus nigris futurae longitudinalis coleoptrorum, thorace exalbido. *Linn. Fn. Suec. §. 460.*
Habitat in Scrophularia.
231. CURCULIO brevirostris femoribus dentatis, corpore viridi argentato. *Linn. Spec. anim. gen. 177. n. 59.*
Curculio femoribus omnibus denticulo notatis, corpore viridi oblongo. *Linn. Fn. Suec. §. 459.*

232. CE-

232. CERAMBYX thorace spinoso, elytris obtusis viridibus nitentibus, femoribus muticis, antennis mediocribus. *Linn. Spec. anim. gen. 179. n. 22.*

Cerambyx viridi-caerulescens, antennis corpus subaequantibus. *Linn. Fn. Suec. §. 478.*

233. LEPTURA deaurata, antennis nigris, femoribus posticis dentatis. *Linn. Spec. anim. gen. 180. n. 1. Fn. Suec. §. 509.*
Habitat in plantis aquaticis.

234. LEPTURA nigra, elytris rubescentibus lividisve apice nigris. *Linn. Spec. anim. gen. 180. n. 2.*

235. LEPTURA thorace globoso, elytris nigris: fasciis flavis: secunda antrorsum arcuata; pedibus ferrugineis. *Linn. Spec. anim. gen. 180. n. 20.*

Leptura nigra elytrorum lineis transversis flavis, pedibus testaceis. *Linn. Fn. Suec. §. 507.*

236. CANTHARIS thorace marginato, tota testacea. *Linn. Spec. anim. gen. 181. n. 11.*

Cantharis elytris testaceis, thorace rubro immaculato. *Linn. Fn. Suec. §. 585.*

237. CANTHARIS thorace marginato, marginibus rubris, elytris nigris. *Linn. Spec. anim. gen. 181. n. 14.*

238. DYTISCUS antennis perfoliatis, corpore laevi, piceo acuminato. *Linn. Spec. anim. gen. 185. n. 1.*

Dytiscus antennis perfoliatis fuscis. *Linn. Fn. Suec. §. 561.*

DESC. *Antennae* clavatae, capitatae, perfoliatae, breves. *Thorax* satis longus, capite latior, subconvexus, glaber. *Sternum* a secundo pedum pari producitur in mucronem subulatum, acutissimum, anum respicientem, abdomini adpressum. *Elytra* laevia, splendida, lineis ex punctis conflatis, longitudinalibus, & invicem parallelis ornata.

Q 3

Pedes

Pedes sex natatorii, ad juncturas, ubi tibiae articulo ultimo adnectuntur, aculeis validis armati. *Color* totus niger, splendidus. *Longitudo* duarum unciarum. Habitat frequens in fossis & piscinis. Piscibus noxius. Docente Kulmio in Actis Breslaviensibus ad annum 1719. *Secl.* 10. p. 593. art. 9.

239. *DYTISCUS* niger thorace elytrorumque margine flavis.
Linn. Spec. gen. 185. n. 5.

Dytiscus niger, elytrorum marginibus dilatatis flavis. *Linn. Fn. Suec.* §. 564. *Hydrocantharus* laevis. *Petiv. Gazoph. tab.* 74. fig. 12.

DESC. *Antennae* setaceae, tenues, articulatae, longitudinem capitis cum thorace aequantes. *Thorax* brevior quam in antecedente. *Pedes* tenuissimi, sex, natatorii; horum anteriora bina paria invicem thoracique approximata sunt, ultimum vero par longissime a reliquis remotum est. Articuli secundi pedum primi paris a latere interiore dilatati sunt in scutellum circinnatum, excavatum. *Color* ater, marginibus thoracis, elytrorumque flavicantibus. Parum minor praecedente. Habitat in fluminibus.

240. *DYTISCUS* ovatus, niger; thorace nigro fascia pallida; elytris albo-maculatis. *Linn. Spec. anim. gen.* 185. n. 12.
Habitat in fossis & fluminibus.

241. *CARABUS* apterus, elytris longitudinaliter punctatis.
Linn. Spec. anim. gen. 186. n. 2.

Carabus ater, elytris convexae punctatis striatisque. *Linn. Fn. Suec.* §. 511.

Carabus niger elytris subvirescentibus convexae punctatis, striatisque. *Linn. Fn. Suec.* §. 512.

Carabus purpurascens-niger, elytris convexae punctatis.
Linn. Fn. Suec. §. 513.

242. CA-

242. CARABUS apterus, elytris porcatis, fulcis scabriusculis, inauratis. *Linn. Spec. anim. gen.* 186. n. 4.
 Carabus viridis, elytris obtuse fulcatis absque punctis, pedibus antennisque ferrugineis. *Linn. Fn. Suec.* §. 517.
 Carabus niger, elytris viridibus obtuse fulcatis, pedibus antennisque nigris. *Linn. Fn. Suec.* §. 518.
243. CARABUS elytris striatis viridi-aeneis, punctis triplici ordine. *Linn. Spec. anim. gen.* 186. n. 8.
244. CARABUS niger, pedibus antennisque piceis. *Linn. Spec. anim. gen.* 186. n. 23.
 Habitat cum praecedentibus sub terra in hortis & agris.
245. MELOË apterus, corpore violaceo. *Linn. Spec. anim. gen.* 188. n. 1.
 Meloë *Linn. Fn. Suec.* §. 596.
 Belgis *Meyworm.*
 Habitat sub terra, in Hollandia rarus, in Germania frequentior.
246. STAPHYLINUS niger, elytris antennis pedibusque ferrugineis. *Linn. Spec. anim. gen.* 191. n. 16. *Fn. Suec.* §. 615.
 Habitat in hortis sub terra.
247. STAPHYLINUS ater, opacus; abdomine subtus splendido.
 Praecedente parum major, & vulgatior in Hollandiae agris stercoreis.
248. FORFICULA elytris apice albis. *Linn. Spec. anim. gen.* 192. n. 1.
 Forficula alis apice macula alba. *Linn. Fn. Suec.* §. 599.
 Belgis *Oorworm.*
 Pestis hortulanorum, fructus plantasque misere lacinians.
249. BLATTA ferrugineo-fusca, femoribus dentatis.

Blatta

Blatta ferrugineo-fusca, elytris fulco oblongo impresso.
Linn. Spec. anim. gen. 193. n. 7. *Fn. Suec.* §. 517.

Scarabaeus testudinatus. *Fab. Column. observ. Cap.* XVIII.

Blatta domestica Luzon. nocturna. *Petiv. Gazoph. Tab.* 48.
fig. 9.

Blatta major fusca. *Sloan. Jam. vol.* 11. *tab.* 237. *fig.* 9.
 10. 11. 12.

Blatta maxima fusca peltata. *Catesb. Carol. app. tab.* 10.
fig. 6.

Blatta Americana, the Cock-roack dicta. *Catesb. ibid.*
fig. 5.

Kakkerlak. *Merian. Surin. pag.* 1. *tab.* 1.

Cum navibus ex Indiis utrisque redeuntibus ad nos adfer-
 tur, hiemem vero non tolerat.

250. *GRYLLUS BULLA* thoracis scutello abdomine longiore.
Linn. Spec. anim. gen. 194. n. 18.

Gryllus elytris nullis, thorace producto, abdomine lon-
 giore. *Linn. Fn. Suec.* §. 624.

Est ex minimis. Habitat in gramine in Campis praesertim
 arenosis.

251. *GRYLLUS ACHETA* thorace rotundato, alis caudatis ely-
 tro longioribus, pedibus anticis palmatis tomentosis.
Linn. Spec. anim. gen. 194. n. 19.

Gryllus pedibus anticis palmatis. *Linn. Fn. Suec.* §. 619.

Gryllo-talpa *Catesb. Carolin.* 11. *tab.* 8.

Belgis *Veen mol.*

In Zeelandiae hortis arvisque nimis frequens & noxium
 animal. In Hollandia rarum.

252. *GRYLLUS ACHETA* thorace rotundato, alis caudatis,
 elytro longioribus, pedibus simplicibus, corpore glau-
 co. *Linn. Spec. anim. gen.* 194. n. 20.

Gryllus cauda bifida, alis inferioribus acuminatis longio-
 ribus, pedibus simplicibus. *Linn. Fn. Suec.* §. 620.

Ha-

Habitat in Domibus, ubique praesertim in culinis, mole-
stum stridore animal. Belgis *Kreekel*, *Krieh*.

253. GRILLUS ACHETA thorace rotundato, cauda bifida
stylo lineari, alis elytro brevioribus, corpore glauco.

Linn. Spec. anim. gen. 194. n. 21.

Gryllus campestris Mouffet. *Sloan. Jam. II. tab. 236. fig. 6.*

Habitat ubique in campis & agris.

254. GRILLUS TETTIGONIA thorace rotundato, alis viri-
dibus immaculatis, antennis setaceis longissimis. *Linn.*

Spec. anim. gen. 194. n. 37.

Habitat in Arvis ubique. Est ex maximis nostratium.

255. GRILLUS TETTIGONIA thorace subquadrato laevi,
alis viridibus, fusco-maculatis, antennis setaceis longi-
tudine-corporis. *Linn. Spec. anim. gen. 194. n. 38.*

*Gryllus cauda ensifera recta, corpore subviridi. Linn. Fn.
Suec. §. 621.*

Habitat in Gramine.

256. GRILLUS TETTIGONIA aptera, thorace rotundato
mutico, corpore viridi.

Habitat in Gramine; Baro deprehenditur.

Est ex minoribus. *Color viridis. Abdomen ovatum compres-
sum, dorso carinato arcuato laevi. Ensis latissimus, sur-
sum recurvatus, maximus, abdominis longitudine, com-
pressus. Elytra vel Alae nulla. Thorax laevis, rotundatus.
Femora mutica.*

257. GRILLUS LOCUSTA thorace subcarinato: segmento
unico, capite obtuso, maxillis atris. *Linn. Spec. anim.
gen. 194. n. 45.*

Ante aliquot annos ingens hujus speciei copia nostros agros
invasit, at superveniente ilico severiore hieme pauca
damna attulerunt.

258. GRYPHUS LOCUSTA thorace subcarinato; alis virefcenti-coeruleis, fascia nigra. *Linn. Spec. anim. gen.* 194. n. 48.

DESC. *Elytra* fasciis tribus subnigrescentibus transversalibus. *Alae* ex virefcenti coeruleae, apicibus hyalinis; prope ad apices fascia transversali lata atra. *Antennae* filiformes, breves. Magnitudo pollicaris vel paulo major. Habitat frequens in collibus arenosis.

259. GRYPHUS LOCUSTA thorace subcarinato depresso, laevi; antennis compressis clavatis.

Gryllus Locusta thorace cruciato, corpore rufo, elytris griseis, antennis subclavatis. *Linn. Spec. anim. gen.* 194. n. 57?

Gryllus antennis subclavatis acutis. *Linn. En. Suec.* §. 626? Habitat in pratis.

I N S E C T A H E M I P T E R A.

260. CICADA fusca, elytris maculis albis lateralibus, fascia duplici interrupta alba. *Linn. Spec. anim. gen.* 195. n. 24.

Ranatra bicolor, capite nigricante. *Petiv. Gazoph. tab.* 61. fig. 9.

Habitat cum sequente in plantis.

261. CICADA flava unicolor.

Praecedente parum minor, & immaculata.

262. NOTONECTA grisea; elytris griseis margine fusco-punctatis. *Linn. Spec. anim. gen.* 196. n. 1. *En. Suec.* §. 688.

Habitat frequens in stagnis.

Belgis *Waater Vloo*.

263. NEPA abdomine ovato; cauda elongata, bifida; antennis thorace majoribus.

Nepa cinerea; thorace inaequali; corpore ovato. *Linn. Spec. anim. gen.* 197. n. 5.

Nepa

Nepa abdominis margine integro. *Linn. Fn. Suec.* §. 691.

Belgis *Waater Schorpioen*.

DESC. Frequens in stagnis. *Color* fusco-cinereus. *Thorax* planus, postice truncatus, margines utrinque integerri-
mi, recti, antrorsum contractiores. *Caput* antice obtusum.
Rostrum satis longum, inflexum sub abdomine, acutum.
Oculi duo sphaerici ad latera rostri in capite. *Antennae*
crassae, laeves, tumidae, cheliferae. *Chelae* monodacty-
lae, digito deorsum ad volam flectente acutiusculo incur-
vato. *Abdomen* superne planum, quatuor alis cruciatim
tectum, subtus in aciem obsoletam contractum; margi-
nibus laevibus integerrimis. *Pedes* IV. teretes, longi, na-
tatorii inermes. *Caudae* binae setaceae, longitudine fere
abdominis, approximatae.

264. *NEPA* abdomine ovato; cauda nulla, antennis brevissimis.
Nepa abdominis margine serrato. *Linn. Spec. anim. gen.* 197.
n. 6.

DESC. Minus frequens, brevior & latior antecedente. *Tho-
rax* subconvexus, latus, antice rotundatus. *Antennae* bre-
vissimae, inflatae, sub thorace latentes, cheliferae. *Abdo-
men* ovatum, breve, thorace haud duplo longius, eoque
parum latius, superne planum quatuor alis cruciatim te-
ctum, inferne in carinam longitudinalem laevem contra-
ctum; postice in acumen obtusiusculum desinens. *Cauda*
nulla. *Color* splendens, nigricans. Margo posterior tho-
racis albicans.

265. *NEPA* Linearis, cauda bifeta, pedibus anticis angustissimis
corporis longitudine.

Nepa linearis manibus spina laterali pollicatis. *Linn. Spec.
anim. gen.* 197. n. 7.

DESC. *Tipulae* aquaticae figuram quodammodo adaequat &
a congeneribus admodum distincta. *Color* fuscus. *Thorax*
oblongus, rotundatus, utrinque versus extremitates latior
& in medio angustior. *Caput* parum. *Oculus* utrinque
promi-

prominens, flavicans. *Rostrum* inflexum. *Antennae* tenuissimae, thorace duplo longiores, graciles, cheliferi. *Chelae* minime inflatae, monodactylae. *Digitus* incurvatus, gracilis, oblongus. *Abdomen* lineare, & quodammodo versus posteriora contractum angustissimum, thoracis longitudinem aequans, convexo-planum, superne alis cruciatim tectum. *Pedes* longissimi, saltatorii, tenuissimi. *Cauda* ex duabus setis filiformibus totius corporis longitudinem superantibus constans. Habitat ad ripas fluminum in arundinetis. *Longitudo* corporis 1. unciae 5. linearum, verum ab apice antennarum usque ad extremitates setarum caudalium 3. unciarum & 5. linearum. *Latitudo* corporis maxima $1\frac{1}{2}$ lineae.

266. CIMEX apterus. *Linn. Spec. anim. gen.* 198. n. 1. *En. Suec.* §. 646.

Habitat in domibus praecipue plebeis.
Belgis *Weeghuys*, *Wandluys*.

267. CIMEX ovatus, thorace utrinque obtuse angulato, abdominis marginibus nigro-maculatis, pedibus antennisque rufis. Cimex ovatus griseus, thorace acute spinoso, antennis rufis. *Linn. Spec. anim. gen.* 198. n. 18.

Cimex griseus ovatus, thorace utrinque acumine angulato, antennis rufis. *Linn. En. Suec.* §. 652.

Habitat in plantis.

268. CIMEX ovatus, niger; elytris nigro alboque variis, alis albis. *Linn. Spec. anim. gen.* 198. n. 42. *En. Suec.* §. 655.

Cimex niger nostras albo-maculatus. *Petiv. Gazoph. tab.* 14. fig. 7.

Habitat in plantis.

269. CIMEX ovatus, caeruleo-aeneus, thorace lineola scutellae apice, elytris puncto albo rubrove. *Linn. Spec. anim. gen.* 198. n. 40. *En. Suec.* §. 654.

Habitat in plantis majoribus sylvestribus.

270. CI-

270. CIMEX rostro arcuato; antennis apice capillaceis, corpore oblongo subvillosa fusco. *Linn. Spec. anim. gen.* 198. n. 48.

Cimex rostro arcuato; antennis apice capillaceis, corpore oblongo nigro. *Linn. Fn. Suec.* §. 647.

Habitat in domibus.

271. CIMEX antennis apice capillaribus, corpore oblongo atro. *Linn. Spec. anim. gen.* 198. n. 50.

Cimex oblongus ater, antennis seta terminatis. *Linn. Fn. Suec.* §. 677.

Habitat in pratis.

272. CIMEX antennis apice capillaribus, corpore oblongo testaceo.

Habitat in gramine.

Magnitudo praecedentis.

273. CIMEX oblongus, rubro nigroque varius, elytris rubris punctis duobus nigris. *Linn. Spec. anim. gen.* 198. n. 55.

Frequens mense Junio in gramine.

274. CIMEX linearis nigricans, compressus: pedibus anticis brevissimis. *Linn. Spec. anim. gen.* 198. n. 82. *Fn. Suec.* §. 685.

Belgis Watervloo.

INSECTA LEPIDOPTERA.

275. PAPILIO EQUES alis caudatis concoloribus flavis, fasciis fuscis, angulo ani fulvo. *Linn. Spec. anim. gen.* 203. n. 27.

Papilio hexapus alis fulvo nigroque variegatis: secundariis angulo subulato maculaque fulvo. *Linn. Fn. Suec.* §. 791.

276. PAPILIO DANAUS alis integerrimis rotundatis albis, venis nigris. *Linn. Spec. anim. gen.* 203. n. 57.

Papilio hexapus, alis erectis rotundatis albis: venis nigris. *Linn. Fn. Suec.* §. 796.

R 3

277. PA-

277. PAPILIO DANAUS alis integerrimis rotundatis albis: subtus venis dilatato - virescentibus. *Linn. Spec. anim. gen.* 203. n. 60.

Papilio hexapus alis rotundatis albis, venis dilatato - virescentibus. *Linn. Fn. Suec.* §. 797.

Duplo minor praecedente, margines antici apicesque alarum superiorum nigricantes.

278. PAPILIO DANAUS alis integerrimis rotundatis albis concoloribus; superioribus nigro bimaculatis, apicibus supra nigris.

Papilio Danaus alis integerrimis rotundatis albis: primoribus maculis duabus apicibusque nigris major. *Linn. Spec. anim. gen.* 203. n. 58?

Habitat in Brassica. Est ex majoribus nostris.

279. PAPILLO DANAUS alis integerrimis rotundatis albis: primoribus supra apicibus nigris, subtus nigro-bimaculatis. Magnitudine & forma cum antecedente convenit.

280. PAPILIO DANAUS alis integerrimis rotundatis albis; primoribus concoloribus bimaculatis, inferioribus supra macula marginali atra.

Papilio alba media apicibus nigris. *Petiv. Gazoph. tab.* 61. *fig.* 1. Est ex minoribus, praecedentibus multo rarior.

281. PAPILIO DANAUS alis integerrimis angulatis flavis: singulis puncto flavo subtus ferrugineo. *Linn. Spec. anim. gen.* 203. n. 73.

Papilio hexapus alis angulatis flavis puncto ferrugineo. *Linn. Fn. Suec.* §. 795.

282. PAPILIO DANAUS alis integerrimis rotundatis, superne fulvis nigro marginatis; secundariis infra puncto argenteo. Habitat in Agris.

283. PAPILIO DANAUS alis integerrimis fuscis: primoribus subtus

subtus ocellis tribus, posticis utrinque quinque. *Linn. Spec. anim. gen. 203. n. 85.*

Papilio tetrapus alis rotundatis fuscis, subtus primariis ocello triplici, inferioribus quintuplici. *Linn. Fn. Suec. §. 788.*

Habitat in arvis & sylvis.

284. *PAPILIO NYMPHALIS* alis angulato-dentatis fulvis, nigro-maculatis, singulis supra ocello coeruleo. *Linn. Spec. anim. gen. 203. n. 88.*

Papilio tetrapus alis angulatis fulvis nigro maculatis: omnibus ocello coeruleo-variegato. *Linn. Fn. Suec. §. 776.*

Admodum frequens in Urticis.

285. *PAPILIO NYMPHALIS* alis subdentatis fusco-nebulosis; primoribus utrinque sesqui-ocello, secundariis supra quatuor, infra sex.

Papilio Nymphalis alis subdentatis fusco-nebulosis: utrinque primoribus sesqui-ocello: posticis ocellis supra tribus. *Linn. Spec. anim. gen. 203. n. 96.*

Papilio tetrapus alis rotundatis fusco-nebulosis: primariis sesquiocello, secundariis quinque ocellis. *Linn. Fn. Suec. §. 785.*

286. *PAPILIO NYMPHALIS* alis dentatis fuscis luteo-variegatis, primoribus ocello utrinque unico; posticis supra tribus. *Linn. Spec. anim. gen. 203. n. 98.*

Habitat in Gramine.

287. *PAPILIO NYMPHALIS* alis dentatis fulvo nigroque nebulosis, primoribus utrinque ocellis duobus; posticis supra unico. *Linn. Spec. anim. gen. 203. n. 101.*

Papilio tetrapus alis rotundatis dentatis, fulvo nigroque nebulosis: primariis ocellis duobus. *Linn. Fn. Suec. §. 784.*

Habitat frequens in sylvestribus.

288. PA-

288. PAPILIO NYMPHALIS alis rotundatis subangulatis rufis, margine omnibus fusco; superioribus ocello utrinque unico bipunctato.

Oculus in ala superiore ater pupillis binis albis: in inferioribus infra puncta 3, 4. vel 5. minutissima alba.

Frequens in Sterilibus.

289. PAPILIO NYMPHALIS alis angulatis fulvis nigro-maculatis; primoribus supra punctis quatuor nigris. *Linn. Spec. anim. gen. 203. n. 113. Fn. Suec. §. 773.*

Omnium vulgatissima apud nos.

290. PAPILIO NYMPHALIS alis angulatis fulvis nigro-maculatis; primoribus supra punctis tribus nigris. *Linn. Spec. anim. gen. 203. n. 114.*

Papilio tetrapus alis angulatis fulvis nigro-maculatis: primariis punctis tribus nigris. *Linn. Fn. Suec. §. 774.*

Vulgaris in Urticis.

291. PAPILIO NYMPHALIS alis angulatis fulvis nigro-maculatis; posticis subtus c albo notatis. *Linn. Spec. anim. gen. 203. n. 115.*

Papilio tetrapus alis angulatis fulvis nigro-maculatis: secundariis v albo notatis. *Linn. Fn. Suec. §. 775.*

Minus frequens apud nos.

292. PAPILIO NYMPHALIS alis dentatis nigris albo-maculatis: fascia communi coccinea primoribus utrinque, posticis marginali. *Linn. Spec. anim. gen. 203. n. 119.*

Papilio tetrapus, alis dentatis nigris albo-maculatis: omnibus fascia arcuata coccinea. *Linn. Fn. Suec. §. 772.*

Frequens in Urticis.

293. PA-

293. PAPILIO NYMPHALIS alis dentatis subfuscis, fascia utrinque alba primoribus interrupta. *Linn. Spec. anim. gen. 203. n. 134.*

Rarissime apud nos. Est ex minimis.

294. PAPILIO NYMPHALIS alis dentatis fulvis nigro-maculatis: subtus fasciis tribus flavis. *Linn. Spec. anim. gen. 203. n. 137.*

Papilio tetrapus, alis rotundatis dentatis fulvis, nigro-maculatis: subtus fasciis tribus flavis. *Linn. Fn. Suec. §. 783.*

Frequens in collibus arenosis.

295. PAPILIO NYMPHALIS alis dentatis fulvis nigro-maculatis, subtus maculis XXI. argenteis. *Linn. Spec. anim. gen. 203. n. 140.*

Papilio tetrapus alis rotundatis dentatis fulvis, nigro-maculatis; subtus maculis XXI. argenteis. *Linn. Fn. Suec. §. 780.*

Habitat cum praecedente.

296. PAPILIO NYMPHALIS alis dentatis fulvis nigro-maculatis subtus maculis XXXVII. argenteis. *Linn. Spec. anim. gen. 203. n. 141.*

Papilio tetrapus alis rotundatis dentatis fulvis nigro-maculatis subtus maculis 37. argenteis. *Linn. Fn. Suec. §. 781.*

Habitat cum praecedentibus.

297. PAPILIO PLEBEJUS alis rotundatis integerrimis, supra coeruleis immaculatis, subtus ocellis nigris sparsis.

Papiliunculus coeruleus vulgatissimus. *Petiv. Gazoph. tab. 35. fig. 1.*

DESC. *Puncta* subtus nigra iride albida cincta, sparsa. *Maculae* 4. vel 5. dilute fuscae subtus ad marginem alae posterioris. *Antennae* nigrae albo annulatae, capitulo rufo.

Habitat cum subsequenter in locis arenosis.

298. PAPILIO PLEBEJUS alis rotundatis integerrimis supra coeruleis, margine rufis, subtus ocellis nigris fascia communi submarginali fulva.

Papiliunculus caerulefcens limbis nigris. *Petiv. Gazoph. tab. 35. fig. 2.*

DESC. *Margo alarum extimus* villosus albus. In alis secundariis inferne ad marginem prope ad anum maculae binae obscure caeruleae & obsolete splendidae.

299. PAPILIO PLEBEJUS alis rotundatis integerrimis, rufis disco coerulefcente; secundariis supra maculis marginalibus fulvis, subtus omnibus.

Papiliunculus e coeruleo fuscus. *Petiv. Gazoph. tab. 35. fig. 3.*

DESC. In alis secundariis supra quatuor maculae fulvae, atro postice terminatae. Infra omnibus ocelli atrii iride alba cincti & fascia macularum fulvarum submarginali.

300. PAPILIO PLEBEJUS alis rotundatis integerrimis rufis; primoribus supra nigro-punctatis: secundariis supra fascia submarginali punctorum fulvorum.

DESC. Subtus alis omnibus maculae atrae non ocellatae & fascia submarginali fulva, in primoribus obsoleta.

E J U S D E M

ANIMALIUM BELGICORUM

CENTURIA QUARTA.

301. PAPILIO PLEBEJUS alis rotundatis integerrimis, rufis; supra fascia macularum fulvarum communi submarginali.

Papiliunculus fuscus marginibus aureis. *Petiv. Gazoph. tab. 35. fig. 4.*

DESC. *Alae supra* rufae, fascia submarginali macularum fulva-